

Informationsbrev inden indlæggelse i isolationsstalden

Velkommen til Universitetshospitalet for Store Husdyr. Din hest skal indlægges på Universitetshospitalet for Store Husdyr i vores isolationsstald. Dette betyder, at der gælder andre regler og en anden prissætning end ved indlæggelse i hospitalets øvrige staldafsnit.

For at oplevelsen bliver så god som muligt, følger her nogle nyttige, specifikke informationer forud for indlæggelsen

Din hest skal indleveres på følgende adresse:
Universitetshospitalet for Store Husdyr
Agrovvej 8
2630 Taastrup

Når din hest indlægges i isolation, **må du ikke læsse den af, før vi er klar**. Ved ankomst skal du ringe til os på tlf. 3533 2860 og blive i bilen.

Undlad at gå ind i receptionen eller andre områder. Dette er vigtigt for at undgå smittespredning.

Hvorfor skal hesten isoleres?

Hvis din hest udviser kliniske tegn, der giver mistanke om en smitsom sygdom, bliver den indlagt i vores isolationsstald. Hvis hesten oprindeligt er blevet indlagt i hospitalets almindelige staldafsnit og senere under indlæggelsen udvikler tegn på smitsom sygdom, flyttes den til isolationsstalden.

Dette sker for at beskytte andre patienter mod smitte, da det kan have alvorlige konsekvenser særligt for heste, der i forvejen er svækkede af andre lidelser.

Nogle af de sygdomme, der kan mistænkes ved indlæggelse i isolation, er såkaldte **zoonoser**.

Det betyder, at de kan smitte mellem hest og menneske og udgør en potentiel sundhedsrisiko for mennesker. Derfor håndteres hesten med særlige forholdsregler.

Kliniske tegn der kan indikere smitsomme sygdomme er blandt andet: feber, diarré, flåd fra næsen, hoste, hævede lymfeknuder, slingerhed og abort. Vi vurderer ofte de kliniske tegn sammen med blodprøver, der kan vise, om hestens immunforsvar bekæmper en infektion. Blodprøver tages rutinemæssigt ved indlæggelse, men der kan også være behov for akutte prøver uden for normal åbningstid. Derudover kan vi tage andre prøver som f.eks. gødningsprøver eller næsesvaber for at finde årsagen til sygdommen.

Hvordan foregår isolationen?

Vores isolationsstald har fire bokse og er underlagt strenge hygiejneregler. Personalet ifører sig engangsovertrækstøj ved kontakt med hesten. Hvis der er mistanke om zoonose, bruges også mundbind. Alt overtrækstøj smides ud efter hvert besøg hos hesten. Hesten beholder sit eget udstyr (grime, dækken) ved indlæggelse. Vi anbefaler, at dette enten desinficeres eller kasseres ved hjemgang. Noget udstyr i isolationsstalden kan genbruges efter desinfektion, mens andet – fx skovle, grebe og koste – kasseres efter brug.

Priser i isolationsstalden

Indlæggelse i isolation kan være bekostelig. Det første døgn koster typisk mellem **10.000–20.000 kr.**

Du får altid et prisestimat ved indlæggelse og bliver løbende opdateret om regningen.



Bemærk, at estimaterne er vejledende, da mange sygdomsforløb i isolation, er uforudsigelige og der kan opstå komplikationer, som kræver yderligere behandling.

Priserne for både indlæggelse samt behandlings- og undersøgelsesprocedurer i isolationsafsnittet, afspejler det meget omfattende forbrug af engangsudstyr samt den ekstra tid det tager at arbejde med hestene under disse forhold.

Alle heste der indlægges på hospitalet, skal betale et indlæggelsesgebyr, materialegebyr og en miljøafgift, som dækker klargøring af boksen med alt hvad det indbefatter i form af desinficering, vask, strøelse og personale (ca. 4.500 kr).

Indlægges hesten i vagten tilkommer der et vagtgebyr oven i denne pris (i alt 5.500 kr). Rykkes hesten fra de almindelige stalde i hospitalet til isolationen, er der allerede betalt et indlæggelsesgebyr, og hesten får derfor ikke et ekstra.

Ud over dette skal alle heste der er indlagt betale et dagligt opholdsgebyr (750 kr.), som dækker mugning, strøelse, fodring og almindelig pasning for hver dag hesten er indlagt. I forlængelse af dette, betaler alle heste også for et dagligt behandlings- og plejeniveau. Dette indledes i niveau 2-5 alt efter hvor ofte hesten skal tilses, og koster mellem 500-2.500 kr., og dækker behandling relateret til hestens lidelse, såsom medicinering, vask af hale og ben ved diarré, opsætning og vedligehold af væskesystemer og -pumper, fysioterapi, løbende kliniske undersøgelser der laves på hesten i løbet af døgnet, og særligt for føl, at de rejses/vendes. Dertil kommer udgifter til den medicin hesten skal have og de diagnostiske test og laboratorieanalyser der skal udføres.

Særligt for operation af isolationspatienter

Hvis din hest skal opereres mens den er indlagt i isolationsstalden, tilkommer der et tillæg på 12.500 kr. Dette dækker den særligt grundige rengøring, som er nødvendig for at sikre en steril operationsstue, selv efter kontaminering af

alvorlige infektioner som salmonella.

Komplikationer

Heste indlagt i isolation er ofte alvorligt syge og påvirket af et kraftigt inflammationsrespons i kroppen. Dette medfører en højere risiko for komplikationer. Hyppigst forekommende komplikationer:

Thrombophlebitis (venebetændelse- og blodprop i blodkarret på halsen):

Som en del af behandlingen vil hesten ofte få intravenøs medicin og væske igennem et venekateter i halsvenen. Dette er absolut nødvendigt, men et venekateter medfører en risiko for, at hesten udvikler venebetændelse med blodproppdannelse (thrombophlebitis). Dette behandles med anti-trombotisk medicin (blodfortyndende) samt varmeterapi, og i mere alvorlige tilfælde også med antibiotika. Thrombophlebitis forsvinder oftest med behandling, men kan i værste tilfælde medføre, at hesten mister funktionen af venen. Thrombophlebitis kan medføre, at hesten skal ultralydsscannes samt blive på hospitalet til behandling i længere tid end først antaget.

Peritonitis (bughindebetændelse):

Der kan opstå infektion i bughinden (peritoneum) efter tarmbetændelse. Dette behandles med bredspektret antibiotika, og det kan være nødvendigt at tage opfølgende prøver af forskellig art. Peritonitis kan øge risikoen for andre komplikationer såsom sammenvoksninger og at tarmen går i stå (ileus), og kan i alvorlige tilfælde betyde at hesten må opereres eller aflives.

Ileus (tarmlammelse):

Ved alvorlig mave/tarm lidelse kan tarmen gå i stå. Dette er en alvorlig komplikation, der kan medføre at hesten får reflux (overfyldning af mavesækken), hvilket behandles med hyppige tømninger af mavesækken (via næse/svælg sonde), IV-væske terapi ved dehydrering og med medicin, herunder tarmstimulerende drop.



Vægttab:

Heste der er alvorligt syge og indlagt i længere tid, vil typisk opleve et større vægttab trods støttefodring. Det tærer på kroppen at være alvorligt syg, og ligesom mennesker, vil hesten have behov for kærlig omsorg og pleje efter hjemgang, hvorefter hesten typisk hurtigt igen vil genvinde den tabte vægt og muskelmasse.

Besøg

Der er ingen mulighed for besøg i isolationstalden pga. smitterisiko. Du opdateres løbende telefonisk om sygdomsforløb, plan og priser. Vi bestræber os på at opdatere dig dagligt, især når din hest er alvorligt syg, men husk på, at der som altid gælder "intet nyt er godt nyt". I vagttid er vagtpersonalet på arbejde, og her kan der forventes kortere og mere overordnede opdateringer.

Ved aflivning kan du komme ind til hesten, men det kræver, at du følger alle personalets instruktioner. Vi anbefaler, at du skifter tøj, når du kommer hjem.

For mere information om biosecurity, se folder fra Den Danske Dyrlægeforening: [viden-om-smittespredning-biosecurity-sept-2024.pdf](#)

Hjemgang

Når din hest er klar til at komme hjem, aftales tidspunktet med dyrlægen eller receptionen. Du modtager et hjemsendelsesbrev med oplysninger om indlæggelsesforløbet og den videre plan, herunder eventuel medicinering. Medicin til de første dages behandling udleveres. Yderligere medicin ordineres via recept.

Hvis hesten afhentes uden for åbningstid, kender vagthavende personale ikke nødvendigvis detaljer omkring din hests forløb, kontakt derfor den ansvarlige dyrlæge i dagtimerne ved spørgsmål.

Husk at få hestens pas med hjem.

Tidlig hjem til karantæne

Nogle heste sendes hjem, før alle prøvesvar foreligger, hvis de er raske og færdigbehandlede. I andre tilfælde er sygdommen bekræftet, men hesten er klinisk rask.

Der anbefales **typisk 3–5 ugers**

hjemmeisolation, afhængigt af prøvesvarene – også selvom hesten virker rask eller har testet negativ (pga. risiko for falsk negative svar). Vi giver altid specifikke anbefalinger i hjemsendelsesbrevet.

